

# Enero es el mes para la detección del cáncer cervical o del cuello uterino



## Datos importantes sobre el cáncer cervical & VPH

- El cáncer cervical se puede prevenir si se hace un examen de detección con regularidad.
- En la mayoría de los casos el cáncer cervical es causado por un virus común llamado Virus Papiloma Humano (VPH).
- La mayoría de las mujeres tendrán el VPH en algún momento de sus vidas pero pocas desarrollarán cáncer cervical.
- Solo si la infección por el VPH persiste por varios años puede poner a la mujer en riesgo de desarrollar cáncer cervical.
- El examen para detectar el cáncer cervical lo puede hacer su médico mediante la prueba de Papanicolaou, si usted tiene menos de 30 años de edad, o mediante la prueba de Papanicolaou y una prueba para detectar el VPH, si tiene 30 años de edad o más.
- La prueba de Papanicolaou busca cambios en las células del cervix, o cuello del útero, que pueden conducir a desarrollar el cáncer.
- La prueba La prueba del VPH busca el virus que causa el cáncer cervical.
- Cuando se usan estas pruebas juntas, el Papanicolau y la prueba del VPH, en mujeres mayores de 30 años, se puede identificar mejor a quienes necesitan intervención temprana para prevenir el cáncer cervical.
- Todas las mujeres deben preguntar a su medico para saber cuál es la prueba de detección más adecuada para cada caso.

**Llame hoy a su médico para pedir una cita.**

<http://www.cluw.org/cervcancer.html>



**Coalition of Labor Union Women**  
1925 K Street, NW, Suite 402  
Washington, DC 20006  
Tel.: 202-223-8360 Fax: 202-776-0537  
E-mail: [info@cluw.org](mailto:info@cluw.org) Website: [www.cluw.org](http://www.cluw.org)

